

## Varianta II

1. Care este procedura recomandată pentru dezinfectia mâinilor în cazul nivelului de risc înalt, conform Ord. MS nr. 961/2016?

Proceduri aplicate	Indicații
- dezinfectia chirurgicală a mâinilor prin frecare cu antiseptic pe bază de alcoolii-4,5pct, după spălarea prealabilă cu apă sterilă și săpun antiseptic-4,5pct	- înainte de toate intervențiile chirurgicale, obstetricale -0,5pct - înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip chirurgical-0,5pct

2. Enumerați manifestările cutanate și tulburările cardiovasculare din șocul anafilactic

Manifestări cutanate:

- eriteme difuze, însoțite sau nu de prurit -2pct
- urticarie -1pct
- edem al feței, al pleoapelor -2pct

Tulburările cardiovasculare:

- hipotensiune arterială – 2pct
- puls tahicardic – 1pct
- cianoză – 1pct
- tuse – 1pct

3. Care sunt factorii determinanți și predispozanți ai crizei de astm bronșic?

Factori alergici (astmul extrinsec sau alergic)-3pct:

Cele mai obișnuite alergene sunt: praful de casa-0,25pct, polenul-0,25pct, pulberile-0,25pct, parul de animal-0,25pct, alergenele alimentare (carne, albus de ou, lapte, peste) -0,25pct, unele medicamente (penicilina, analgetice) -0,25pct, detergenți-0,25pct, coloranți-0,25pct.

Factori nealergici (astmul intrinsec)-3pct:

Rolul cel mai important îl au factorii infecțioși (bronșite cronice, sinuzite etc)-1pct

Apariția crizelor poate fi favorizată de expuneri la frig-0,25pct, ceata, umezeala-0,25pct, trecerea brusca de la aer cald la aer rece-0,25pct, precum și de factori emoționali-0,25pct.

4. Care sunt manifestările clinice în scarlatină?

- debut cu febra 38-39°C, frisoane, -1pct; dureri faringiene și abdominale, varsături, cefalee -1pct
- amigdale hipertrofice, intens hiperemice, uneori cu depozite pultacee -1pct
- limba saburală -1pct
- adenopatie satelită sensibilă -1pct

-in perioada de stare exantemul debuteaza pe torace si radacina membrelor, generalizindu-se in urmatoarele 1-2 zile – 1pct, dar respectind fata, palmele si plantele- 1pct.

Eruptia este micropapuloasa, aspra pe fondul unui rash mai intens la plicile de flexie,- semnul Grozovici-Pastias -2pct.

Faciesul pare palmuit, masca Filatov-cu paliditate perioronazala si obraji congestive - 1pct.

**5. Erizipelul – definiție**

=este o boala infecțioasă acută a tegumentului – 4pct, determinată de streptococul beta-hemolitic din grup A- 3pct, caracterizată clinic prin apariția unui placard de dermită acută, febra și frison -3pct.

**6. Pentru a urmări bilanțul lichidian în organism, ce trebuie să urmărească și să noteze asistenta medicală?**

-intrările -2pct                    - apa din alimente și bauturile -1pct  
                                                 - perfuziile -1pct  
                                                 -transfuziile -1pct  
-iesirile -2pct                    -urina – 0,75pct  
                                                 - scaun – 0,75pct  
                                                 - varsături – 0,75pct  
                                                 - drenaje – 0,75pct

**7. Enumerați materialele necesare pe care trebuie să le pregătească asistenta medicală în vederea efectuării paracentezei (puncției abdominale)**

-materiale de protecția patului -1pct  
-instrumente și materiale sterile-1pct: trocar cu diametrul de 3-4 mm-1pct, seringi, ace, bisturiu, pense hemostatice, câmp chirurgical-1pct, comprese, tampoane, tuburi prelungitoare-1pct, manșuri chirurgicale -1pct  
-eprubete, cilindru gradat, galeata gradate de 10 litri -1pct  
-tavita renală -1pct  
-dezinfectant -1pct  
-anestezic local -1pct

**8. Care sunt obligațiile producătorilor de deșuri medicale conform Ord.1226/2012 (pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale)?**

-prevenirea producerii deșeurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate a acestora; - 3,5pct  
-separarea diferitelor tipuri de deșuri la locul producerii/generării; - 4pct  
-tratarea și eliminarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deșuri medicale produse. – 3,5pct

**9. Îngrijirea pacientului după efectuarea transfuziei de sânge**

-se așează comod, se acoperă – 2,5pct

- se asigură temperatura camerei cu 1-2°C mai ridicată – 2,5pct
- se oferă pacientului lichide calde (dacă este permis) – 2,5pct
- se alimentează după 2 ore de la terminarea transfuziei (dacă este permis) – 2,5pct

**10. Montarea electrozilor pe membre în vederea înregistrării electrocardiogramei -  
corespondența culorilor**

- Roșu = mâna dreaptă – 2,5pct
- Galben = mâna stângă – 2,5pct
- Verde = picior stâng – 2,5pct
- Negru = picior drept – 2,5pct